EFFACER TOUTES LES DONNÉES

CLINIQUE DU SOMMEIL BEAULIEU

PRÉNOM:

NOM:

N.A.M.:

RAPPORT D'OXYMÉTRIE NOCTURNE

Date de l'étude :

Durée d'enregistrement:

Enregistrement: ☐ Externe ☐ Hospitalisé ☐ Pré-opératoire

Conditions d'enregistrement : ☐ De base ☐ Avec O2 L/min ☐ Avec CPAP/VNI cm H2O

Qualité générale du test : ☐ Bonne ☐ Insuffisant

SaO2 de base (%):

Index d'événements désaturants: /heure(s) enregistrement

Saturation inférieure à 90%: % du temps d'enregistrement

Aspect qualitatif du tracé de saturation

- ☐ Dans les limites de la normale
- ☐ Faibles fluctuations non spécifiques de la saturation
- ☐ Désaturations périodiques profondes typiques d'apnées-hypopnées obstructives
- ☐ Désaturations continues et stables, tout au long de la nuit, suggestives d'hypoventilation nocturne
- ☐ Désaturations périodiques régulières et de faible amplitude, évoquant une respiration périodique de type de Cheyne-Stokes
- ☐ Fluctuations régulières de la fréquence cardiaque

Les événements sont quantitativement: ☐ Non significatifs ☐ Légers ☐ Modérés ☐ Sévères

IMPRESSION:

☐ Oxymétrie nocturne dans les limites de la normale

☐ Oxymétrie nocture compatible avec un diagnostic de:

- ☐ Respiration périodique Cheyne-Stokes ☐ Sévères ☐ Modérées ☐ Sévères
- ☐ Respiration périodique Cheyne-Stokes
- ☐ Hypoventilation nocturne

☐ Anomalies non spécifiques

☐ Oxymétrie à reprendre

☐ Considérer un test plus élaboré pour mieux définir la nature des événements désaturants ou la cause des événements désaturants

Commentaires:

Interprété par: Dr Frédéric Sériès Date:

Signature du pneumologue: